

MESURES ESPECÍFIQUES PER REDUIR LA TRANSMISSIÓ DE MICROORGANISMES EPIDEMIOLOGICAMENT MÉS RELLEVANS

TIPUS DE MICROORGANISME	TIPUS DE RESISTÈNCIA**	ACTIVACIÓ DE L'ALERTA	CONTROL RESERVI	MESURES DE PRECAUCIÓ
● <i>Staphylococcus aureus</i>	Meticil·lina	Oxacil·lina (R)	Nasal	De contacte
● <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Carbapenemes***	Ceftolozano/Tazobactam (R)	Faringi	De contacte
<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Klebsiella pneumoniae</i> ● <i>Klebsiella aerogenes</i> ● <i>Proteus mirabilis</i> ● <i>Citrobacter freundii</i> ● <i>Morganella morganii</i> ● <i>Providencia rettgeri</i> ● <i>Serratia spp.</i> ● <i>Shigella boydii</i> ● <i>Shigella sonnei</i> 	Betalactamases d'espèctre estès (BLEE)	Cefepime (R)	Rectal	De contacte
<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Klebsiella pneumoniae</i> ● <i>Proteus mirabilis</i> ● <i>Salmonella enterica</i> 	Cefamicinases (Amp-C)	Cefepime (S) + Cefoxitina (R)	Rectal	De contacte
● <i>Enterobacteries spp.</i>	Carbapenemes***: Tipus VIM Tipus NDM Tipus OXA48 Tipus GES Tipus KPC Tipus IMP	Identificació del tipus de carbapenemasa	Rectal	De contacte
<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Enterococcus faecalis</i> ● <i>Enterococcus faecium</i> 	Resistència als glucopèptics	Vancomicina (R)	Rectal	De contacte
● <i>Acinetobacter baumannii</i>	Resistència als carbapenèmics	Imipenem (R)	-	De contacte
● <i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	Resistència a cotrimoxazol	Trimet/Sulfa (R)	-	De contacte
● <i>Clostridioides difficile</i>	-	<ul style="list-style-type: none"> ● Inmunocromatologia (GDH/Toxina): positiva ● PCR Toxina: positiva 		De contacte

PACIENT AMB UNA MOSTRA CLÍNICA O EPIDEMIOLÒGICA POSITIVA:

*Activació de l'alerta

**Iniciar: mesures de precaució de contacte, per cohorts segons tipus de resistència

Duració: durant tot l'ingrés

PACIENT AMB ANTECEDENTS D'INFECCIÓ PER MULTIR

Iniciar: mesures de precaució de contacte, per cohorts segons tipus de resistència

Control reservori: nasal/faringi o rectal

Interpretació resultats:

Faringi/rectal:

- Si negatiu: retirar les mesures i l'alerta
- Si positiu: continuar amb les mesures, repetir controls: 1 cop al mes

Nasal i mostra clínica (MRSA):

- Si 3 controls negatius nasal i mostra clínica, retirar mesures i l'alerta informàtica
- En cas contrari seguir amb les mesures

MESURES DE PRECAUCIÓ DE CONTACTE:



***Ajuntar pacients per cohorts segons tipus de carbapenemasas