

Observación del uso de guantes clínicos: conocer situaciones del uso inadecuado en ámbito hospitalario.

Gil Alvarez, Sara: DUE Hospital de Mataró

Rios Salvany, Meritxell: DUE Hospital de Calella

Sosa Arias, Leticia: DUE Complex Hospitalari Moisès Broggi

IRAS

Complicación más frecuente a nivel mundial

Vehículo más común de transmisión de microorganismos:

- manos de los profesionales
- uso continuo e inadecuado de los guantes clínicos.

El mal uso de guantes conlleva:

- gran coste económico y ambiental
- pérdida de oportunidades de higiene de manos
- aumento del riesgo de infección cruzada



OBJETIVOS


- Conocer el porcentaje de uso inadecuado de guantes clínicos.
- Detectar los momentos en los que se produce el uso inadecuado.

MÉTODO


- Estudio observacional descriptivo.
- Transversal multicéntrico.
- Observación en unidades de hospitalización, urgencias y UCI.
- Categorías profesionales: DUE, TCAE, médicos y celadores.
- Turno mañana y tarde.

RESULTADOS

N=856 observaciones de momentos de uso de guantes



Uso inadecuado de los guantes 376 totales



CONCLUSIONES

- Formación.
- Conocer causas.

Uso adecuado de guantes



menor coste económico



menor impacto ecológico



disminución de la transmisión cruzada



**ENTRE TODOS
SALVAMOS
VIDAS**

